



علائم آپاندیسیت چیست؟

علائم کلاسیک آپاندیس عبارتند از:

درد مبهم در نزدیکی ناف و یا قسمت تحتانی شکم که به سمت پایین و سمت راست حرکت کند.

اغلب این حالت اولین نشانه آپاندیسیت است.


- از دست دادن اشتها.
- تهوع و یا استفراغ که بعد از شروع شکم درد بروز میکند.
- ورم شکم.
- تب.
- ناتوانی در دفع گاز معده.



علل آپاندیسیت چه چیزهایی می‌تواند باشد؟

آپاندیسیت زمانی رخ می‌دهد که آپاندیس توسط مدفوع یا یک جسم خارجی مسدود شود، ممکن است زمانی که آپاندیس بر اثر عفونت سایر اعضای بدن متورم می‌شود انسداد در آپاندیس بر اثر عفونت به وجود بیاید.

آپاندیس یک زائد کوچک انگشتی مانند به طول حدود ۱۰ سانتی متر می‌باشد که متصل به ابتدای روده بزرگ و در ناحیه پایین و راست شکم می‌باشد.




آشنایی با بیماری آپاندیسیت


آپاندیسیت به معنی التهاب آپاندیس بوده و شایعترین علت التهاب حاد در قسمت تحتانی راست شکم می‌باشد، این عارضه شایعترین علت جراحی اورژانس شکم می‌باشد که میباشد توسط پزشک معاینه شود.

اگر آپاندیس ترکید؟

متاسفانه در بچه‌ها زمانی که آپاندیس شروع می‌شود تا زمانی که بترکد خیلی کوتاه است و امکان دارد حداقل یک یا دو روز باشد، اگر به بیمار دیر رسیدگی شود آپاندیس سوراخ و چرك و عفونت وارد فضای شکم می‌شود و شکم کاملاً سفت و درد شدیدی ایجاد خواهد شد، از سوی دیگر کودک ممکن است دچار تب بالا شود.



آپاندیسیت



بیمارستان سلامت فردا
SALAMAT FARDA HOSPITAL

آدرس: اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، بیمارستان سلامت فردا

تلفن: +۹۸ ۲۱ ۴۹۲۲۹۰۰

تلگرام: +۹۸ ۹۳۵ ۱۱۵ ۳۹۶۲

ایمیل: www.salamatfardahospital.com

اینستاگرام: Slamatfarda_hospital



.....

درمان

درمان بیماری غالباً جراحی است که آپاندیس به وسیله جراح برداشته می‌شود.

برداشتن آپاندیس با عمل جراحی



در چند روز اول بعد از عمل جراحی بیمار احساس درد دارد، در بیمارستان مسکن به بیمار داده می‌شود تا شدت درد کاهش پیدا کند، بعد از مرخص شدن بیمار از بیمارستان ممکن است پزشک معالج برای بیمار مسکن‌های خوراکی تجویز کند.

وقتی بیمار دچار تب و تهوع یا درد شکم می‌شود نباید ملین یا مسکن بخورد.

تقریباً در نیمی از موارد این علائم نیز بروز می‌کنند:

- درد مبهم و تیر کشیدن شکم در هر نقطه از آن پایین بالا و یا حتی در مقعد.
- ادرار دردناک.
- استفراغ قبل از بروز درد شکم.
- گرفتگی شدید و دلپیچه.
- بیبوست و اسهال همراه با دفع گاز.

اگر با هر یک از علائم بالا مواجه شدین بلافضله به اورژانس مراجعه کنید.

خوردن نوشیدن و یا استفاده از هرگونه دارو و یا استفاده از کیسه آب گرم می‌تواند منجر به ترکیدن و پارگی در آپاندیس شود.

تشخیص بیماری و درمان

- انجام معاينه بالینی توسط پزشك.
- انجام آزمایش خون و ادرار.
- انجام رادیوگرافی و سونوگرافی.

منبع: پرستاری داخل - جراحی برونر سودارت