




## آزمایش های تشخیصی

چندین راه جهت بررسی زخم معده وجود دارد:


- بلع باریم که به تعیین محل زخم کمک می کند و توسط عکس برداری با اشعه ایکس انجام می شود.
- معاینه آندوسکوپیک با دستگاه آندوسکوپ که از طریق دهان انجام می شود و معمولاً جهت راحتی حال بیماران با بیهوشی صورت می پذیرد.
- نمونه برداری از معده از طریق آندوسکوپی جهت تعیین ابتلا به هلیکوباتر نیز راه تشخیصی دیگر است.
- آزمایش تنفسی و سرمی نیز از راه های تشخیصی علت زخم می باشد.



## علاجم شایع زخم معده

زخم معده و اثنی عشر ممکن است علاجم موقت و یا دائمی داشته باشند. این علاجم عبارتند از:

- تهوع و استفراغ
- سوزش معده، احساس گرسنگی مداوم یا پیچ خوردن معده
- دردهای شبانگاهی معده و یا احساس درد و سوزش معده بعد از غذا خوردن
- دردهای تیر کشند که با غذا خوردن و یا غذا نخوردن بهتر می شوند.
- مدفوع تیره یا خون آلود
- از دست دادن اشتها و کاهش وزن
- احساس پری در شکم



لایه پوشاننده معده و اثنی عشر به طور طبیعی دارای یک سد مخاطی می باشد که آن را از شیره ی گوارشی که خیلی اسیدی می باشد حفظ میکند، اگر این سد محافظ آسیب بیند ممکن است باعث التهاب و از بین رفتن لایه پوششی شود، این قسمت از بین رفته را اصطلاحاً زخم گوارش می نامند که دو نوع است: زخم معده و زخم اثنی عشر.



## زخم معده و اثنی عشر

زخم معده و اثنی عشر یک مشکل ناخوشایند می باشد که ممکن است به علت مصرف غذاهای پر ادویه، فشار روحی یا داشتن استرس به صورت مداوم، استعمال سیگار و الکل و همچنین ابتلا به عفونت هلیکوباتر پیلو-وری ایجاد شود.



# زخم معده و اثنی عشر



بیمارستان سلامت فردا  
SALAMAT FARDA HOSPITAL

آدرس: اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، بیمارستان سلامت فردا

+۹۸ ۲۱ ۴۹۲۲۹۰۰

+۹۸ ۹۳۵ ۱۱۵ ۳۹۶۲

[www.salamatfardahospital.com](http://www.salamatfardahospital.com)

Slamatfarda\_hospital

اصولاً پس از مصرف و تکمیل دوره درمان دارویی عفونت شما برطرف خواهد شد. اما همیشه احتمال عود مجدد این مشکل وجود دارد. در صورت برگشت علیم و یا عدم بهبودی حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

لطفاً در طول مصرف درمان دارویی از مصرف سیگار و الکل و استفاده مکرر از برخی مسکن‌های خودداری نمایید.

در صورت وجود علیمی مانند استفراغ مکرر یا خونی، درد ناگهانی و تیر کشندۀ در معده، کاهش وزن و یا مدفوع تیره حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

## درمان

پس از انجام تست‌های تشخیصی جهت تعیین وجود زخم و علت آن، پزشک درمان دارویی را برای شما آغاز خواهد کرد.

برای از بین بردن عفونت هلیکوباتر پیلوئی مصرف برخی آنتی‌بیوتیک‌ها ضروری است. در کنار مصرف آنتی‌بیوتیک، غالباً پزشک آنتی‌اسید‌ها و برخی داروهای دیگر را نیز تجویز می‌کند.

این داروها ممکن است در ابتدا باعث ایجاد ناراحتی برای شما شوند. لطفاً صبور باشید و دقیقاً مطابق دستور پزشک به مصرف داروهای خود ادامه دهید.



منبع: پرستاری داخلی و جراحی بودند و سودارت، نویسنده‌گان  
جانیس ال هینکل، کراج چیوید مترجم مریم علیخانی  
۲۰۱۸ (گوارش) - انتشارات جامعه نگر  
جلد ۱۰