

برداشتن بخشی از دیسکی که دچار فتق شده است و تکه‌هایی که دچار شکستگی شده‌اند می‌کند.

## نتایج حاصل از جراحی

جراحی لامینکتومی برای رفع فشار از روى اعصاب نخاعی یک جراحی موفقیت آمیز است که در بسیاری از بیماران باعث کاهش پا درد خواهد شد و به این ترتیب سطح فعالیت جسمانی آن‌ها به طرز قابل توجهی بهبود می‌یابد و می‌توانند به طور طبیعی به انجام فعالیت روزمره خود بپردازند.

## عواضی لامینکتومی

به طور کلی جراحی لامینکتومی یک روش ایمن است اما در این روش نیز همانند سایر روش‌های جراحی ریسک بروز عوارض زیر وجود دارد مانند:

- خونریزی.
- بروز عفونت.
- تشکیل لخته‌ی خون.
- آسیب دیدگی عصب.
- نشت مایع نخاعی.

• در صورتی که بیمار کنترل عملکرد مثانه یا روده خود را از دست داده باشد.

• در برخی موارد لامینکتومی به عنوان بخشی از فرآیند جراحی برای درمان فتق دیسک انجام می‌شود، در این حالت ممکن است پزشک به منظور دسترسی به دیسک آسیب دیده مجبور باشد بخشی از لامینا را خارج کند.

## جراحی لامینکتومی چگونه انجام می‌شود؟

معمولًا جراح برای انجام این عمل جراحی از بیهوشی عمومی استفاده می‌کند و به این ترتیب شما در حین جراحی چیزی را احساس نمی‌کنید و کاملاً بیهوش خواهید بود.

جراح یک برش را در کمر شما بر روی مهره آسیب دیده ایجاد می‌کند سپس عضلات این قسمت را کنار می‌زند تا بتواند به خوبی به ستون فقرات دسترسی داشته باشد، اندازه محل برش می‌تواند بر اساس شرایط شما و اندازه بدن متغیر باشد. عموماً در جراحی‌هایی که تهاجم کمتری دارند در مقایسه با جراحی باز از برش‌های کوچک‌تری استفاده می‌شود.

در صورتی که جراحی لامینکتومی به عنوان بخشی از فرآیند درمان فتق دیسک انجام شود جراح اقدام به

## لامینکتومی

ستون فقرات از روی هم قرار گرفتن سی مهره تشکیل شده است. در بین مهره‌ها استوانه‌های کم ارتفاعی به نام دیسک قرار گرفته اند که مانند لاستیک و یا فنر حالت ارتجاعی داشته و ضربات شدید وارد به مهره‌ها را جذب می‌کنند.

نخاع در درون ستون مهره قرار گرفته و از درون تک تک مهره‌ها عبور می‌کند که به آن کانال نخاعی گفته می‌شود.

لامینکتومی یک روش جراحی برای درمان تنگی کانال نخاعی و دیسک بین مهره‌ای می‌باشد. در این روش قوس پشتی مهره که لامینا نامیده می‌شود برداشته شده و کانال نخاعی وسیع و گشاد می‌شود.

## دلایل انجام لامینکتومی

• در صورتی که درمان مراقبتی از قبیل ورزش درمانی و فیزیوتراپی و مصرف دارو نتواند به بهبود علائم کمک کند.

• در صورتی که بیمار دچار ضعف یا بی‌حسی عضلانی است که باعث می‌شود راه رفتن یا ایستادن برای او بسیار دشوار باشد.



## مراقبت های بعد از جراحی

- به هنگام استراحت کردن راستای بدن را در جهت صحیح قرار دهید و از فشار آوردن به مهره ها یا خمیده شدن آنها خودداری فرمائید، همچنین خوابیدن روی شکم ممنوع است.
- به منظور حفظ ستون مهره ها در یک راستا، به مدت یک ماه از تشک سفت استفاده کنید.
- به منظور جلوگیری از لخته شدن خون، در زمان استراحت، پاهای را ورزش دهید.
- کمربند طبی موجب ثابت ماندن ستون مهره ها در دوران نقاوت می شود، لذا حین راه رفتن و حین تغییر حالت بدن، آن را بیندید.



- از توالت فرنگی استفاده کنید.
- حدالامکان از خم و راست شدن خودداری کنید و نماز خود را پشت میز و به حالت نشسته بخوانید.
- هنگام راه رفتن از کفش های تخت و سفت استفاده کنید.
- استراحت مطلق بعد از جراحی به هیچ عنوان توصیه نمی شود. همچنین انجام فعالیت های سنگین نیز برای بیمار مضر است.
- از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.
- بالا رفتن و پایین آمدن از پله بلامانع است، اما سعی کنید یک پله یک پله بالا یا پایین بروید و از نرده کمک بگیرید.
- رانندگی کردن پس از گذشت یک ماه و کسب بهبودی نسبی، با دستور پزشک معالج بلامانع است.
- مصرف غذایی پروتئینی و ویتامین ها بخصوص دریافت کلسیم و ویتامین دی توصیه می شود.
- روزانه ۸ لیوان آب میل کنید.
- ۱۰ تا ۱۴ روز بعد از عمل جراحی، جهت کشیدن بخیه ها به درمانگاه مراجعه کنید.
- در صورت قرمزی، درد بیش از حد و ترشحات چركی در ناحیه جراحی به پزشک معالج مراجعه کنید.

## لامینکتومی



بیمارستان سلامت فدا

SALAMAT FARDA HOSPITAL

آدرس: اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، بیمارستان سلامت

+۹۸ ۲۱ ۴۹۲۲۹۰۰

+۹۸ ۹۳۵ ۱۱۵ ۳۹۶۲

[www.salamatfardahospital.com](http://www.salamatfardahospital.com)

@Slamatfarda\_hospital