



کanser سرویکس



بیمارستان سلامت فردا
SALAMAT FARDA HOSPITAL

آدرس: اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، بیمارستان سلامت فردا

+۹۸ ۲۱ ۴۹۲۲۹۰۰۰


+۹۸ ۹۳۵ ۱۱۵ ۳۹۶۲

www.salamatfardahospital.com

Slamatfarda_hospital

راه های پیشگیری

- با پزشک در مورد واکسن پاپیلوما مشورت کنید.
- به طور مرتب پاپ اسمیر انجام دهید و تغییرات را قبل از سرطانی شدن پیگیری کنید.
- از مصرف دخانیات اجتناب کنید.
- ملاحظات لازم در مقاربت برای جلوگیری از عونت ها واژن.



مراقبت ها و آموزش ها

- کنترل درد به کمک مسکن (با تجویز پزشک).
- لکه بینی و ترشحات خونی یا قهوه ای و صورتی حتی تا چند هفته بعد از جراحی وجود دارد که در صورت شدید نبودن طبیعی است.
- یکی دو روز بعد از جراحی احساس خستگی وجود دارد که استراحت کنید.
- از بلند کردن اجسام سنگین پرهیز کنید.
- ممکن است احساس پری مثانه یا تخلیه منید که چند روز بعد از جراحی بهبود می یابد.
- در صورت درد و خونریزی شدید واژینال و تب بالای ۳۸ درجه، تنگی نفس و درد قفسه سینه، تورم، ترشح چرکی یا قرمز و ترشحات بد بو واژن حتما به پزشک معالج اطلاع دهید.

درمان

- رادیوتراپی.
- شیمی درمانی.
- تارگت تراپی (درمان هدفمند): تمرکز روی نقاط ضعف سلول سرطانی است.

۱- کتاب سرطان درمانی

نویسنده: ماکس گرسون

مترجم: سید ماشالله فرخنده

۲- کتاب برونسودارث (سرطان)

۳- کتاب بیولوژی سرطان وینبرگ اثر آرزو صیاد



علل ابتلا

سلول های دهانه رحم با سرعت مشخص رشد و تکثیر می کنند، زمانی که تغییراتی (موتاسیون) در DNA سلول های دهانه رحم رخ می دهد به طور غیر قابل کنترلی رشد می کنند و تکثیر می یابند، تجمع آن ها باعث ایجاد توده ای می شود که تومور نام دارد. این تومور می تواند به بافت های مجاور هجوم برده و باعث متاستاز شوند، مشخص نیست دقیقا چه عاملی سبب سرطان رحم می شود ولی یقینا ویروس پاپیلوما ی انسانی نقش مهمی در آن دارد. البته اغلب کسانی که ویروس پاپیلوما دارند دچار سرطان نمی شوند ولی عامل محیط و نوع زندگی سالم در این امر موثر است.

ژنتیک و سابقه خانوادگی هم می تواند زمینه ساز ایجاد سرطان دهانه رحم شود.


نشانه و علائم

مراحل ابتدایی آن علامتی ندارد ولی در مراحل پیشرفته به صورت:

- خونریزی واژینال بعد قاعدگی یا مقاربت.
- ترشحات رقیق خونی از واژن با بوی نامطبوع.
- درد لگن.
- درد هنگام مقاربت.

سرطان دهانه رحم

نوعی از سرطان است که در دهانه رحم یعنی قسمت پایین رحم در محل اتصال به واژن بروز می کند.



انواع آن

۱- کارسینوم سلول اسکواموس:

در این نوع سرطان لایه نازک مسطح سلول های خارجی دهانه رحم که به داخل واژن می روند شروع می شود، بیشتر سرطان های رحم از این نوع هستند.

۲- آدنوکارسینوم:

این نوع در سلول های ستون مانند که کانال دهانه رحم را می پوشانند ایجاد می شود، در برخی موارد هر دو نوع از این سلول ها درگیر می شوند.

چه موقع به پزشک مراجعه کنیم؟

چنانچه علائمی مانند علائم ذکر شده داشتید حتما لازم است به پزشک متخصص مراجعه کنید.

روش های تشخیص

ابتدا از بیوپسی دهانه رحم (برداشتن تکه بسیار کوچکی از بافت دهانه رحم) استفاده می شود، در صورتی که نتیجه آزمایش مشکوک بود ممکن است نیاز به برداشتن وسیع تری باشد.

تعیین مرحله سرطان

از روش هایی مانند: رادیوگرافی- سی تی اسکن- MRI- پت اسکن- معاینه دقیق مثانه- واژن و رحم- رکتوم جهت تعیین stage آن استفاده می شود.

عوامل خطر افزایش ابتلا

- ۱- داشتن روابط جنسی با افراد مختلف.
- ۲- شروع زود هنگام روابط جنسی.
- ۳- ابتلا مکرر به سایر عفونت های مقاربتی.
- ۴- استعمال دخانیات.
- ۵- ضعف سیستم ایمنی.